

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด

-
- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. ชุดโครงการวิจัย | : | วิจัยและพัฒนากาแฟ |
| 2. โครงการวิจัย | : | การปรับปรุงพันธุ์กาแฟ |
| กิจกรรม | : | การปรับปรุงพันธุ์กาแฟโรบัสต้า |
| 3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) | : | การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสต้าชุดที่ 2 ในแหล่งปลูกต่าง ๆ |
| ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) | : | The Evaluation Trials of DOA Recommended Robusta Clones at Certain Sites |
| 4. คณะกรรมการ | | |
| หัวหน้าการทดลอง | : | นางสาวปานหยา นพขินวงศ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร |
| ผู้ร่วมงาน | : | นางสุรีรัตน์ ปัญญาโถนະ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร |
| | : | นายเสรี อุยสติตย์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร |
| | : | นางเพ็ญจันทร์ สุठนานุกูล ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย |
| | : | นางนิตยา คงสวัสดิ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ |

5. บทคัดย่อ

การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสต้าชุดที่ 2 ในแหล่งปลูกต่าง ๆ

The Evaluation Trials of DOA Recommended Robusta Clones at Certain Sites

ปานหยา นพขินวงศ์¹ สุรีรัตน์ ปัญญาโถนະ¹ เสรี อุยสติตย์¹ เพ็ญจันทร์ สุठนานุกูล²
และนิตยา คงสวัสดิ์³

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสต้าพันธุ์แนะนำชุมพร 2 ชุมพร 4 และชุมพร 5 ในแหล่งปลูกต่าง ๆ ได้แก่ แปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพร ระนอง และอุตรดิตถ์ ในปี 2553-2561 ผลการทดลองพบว่าการเจริญเติบโตของต้นกาแฟในเขตภาคใต้ดีกว่าในเขตภาคเหนือ เนื่องจากปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนดีกว่า โดยพันธุ์ชุมพร 2 เมื่ออายุ 5 ปี ให้ผลผลิตสูงที่สุดที่จังหวัดชุมพรและอุตรดิตถ์ ที่จังหวัดระนองพันธุ์ชุมพร 5 ให้ผลผลิตเป็น

¹ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

² ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัchanalay จ.สุโขทัย 64190

³ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

ที่ 1 เกือบทุกปี แต่เป็นพันธุ์ชุมพร 4 ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด ทั้งนี้เมื่อนำผลผลิตแต่ละปีมาเฉลี่ยรวมแล้ว ทุกพันธุ์ให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน

Abstract

The Evaluation Trials of DOA Recommended Robusta Clones at Certain Sites

Parnhathai Nopchinwong¹, Sureerat Panyatona¹, Seree Usathid¹, Penchan Sutthanukul²

and Nittaya Kongsawad³

Chumphon Horticultural, Research Center, Horticulture Institute

The evaluation trials were conducted at farmer's plots in the South at Chumphon and Ranong, and in the North at Uttaradit during 2010-2018. In general, growth of all clones in the South was higher than that in the North, due to higher total rain volume and wider rain distribution. At 5 years old, Chumphon 2 yielded highest at Chumphon and Uttaradit Province while Chumphon 4 at Ranong but Chumphon 5 yielded regularly first in rank. When averaged yield at each sites, all recommended clones yielded similarly quantity.

¹ Chumphon Horticultural Research Centre. Wisai Tai, Sawi, Chumphon, 86130, Thailand

² Sukhothai Horticultural Research Centre, Tha-chai, Srisatchanalai, Sukhothai, 64190, Thailand

³ Srisaket Horticultural Research Centre, Nong-phai, Muang, Srisaket, 33000, Thailand

6. คำนำ

กาแฟโรบสตาเป็นพืชที่มีแหล่งปลูกใหญ่ในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า ผลผลิตกาแฟโรบสตาต่อพื้นที่ต่ำลง เรื่อยๆ ซึ่งน่าจะมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ (Marsh *et al.*, 2006) ปัจจัยหนึ่งที่นับได้ว่าสำคัญมาก คือ พันธุ์ที่ใช้ปลูก เดิมเกษตรกรปลูกกาแฟด้วยกล้าที่เพาะจากเมล็ด และเป็นที่ทราบกันดีว่า เมล็ดกาแฟโรบสตาได้มาจากการผสมข้าม (cross-pollinated) ดังนั้น ต้นกาแฟที่ปลูกกันมาแต่เดิม จะมีลักษณะแปรปรวนมาก โดยทั่วไปให้ผลผลิตต่ำ ดังนั้น ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจึงมีการดำเนินงานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ โดยได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนนำเข้าพันธุ์กาแฟโรบสตาจากต่างประเทศ เพื่อนำมาคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและเมล็ดมีคุณภาพ ดีกว่าพันธุ์ที่ปลูกกันอยู่ทั่วไป ขณะนี้การวิจัยได้ดำเนินมาจนสามารถคัดเลือกพันธุ์ดีซึ่งเป็นพันธุ์ต่างประเทศที่นำเข้ามาครั้นที่ 1 (พาณิช และคณะ, 2550) และ 2 (สุริรัตน์ และยุพิน, 2550) ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ได้หลายสายต้น (clones) พันธุ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรแล้ว ได้แก่ พันธุ์ชุมพร 2 (FRT65) และพันธุ์ชุมพร 84-4 (FRT09) และชุมพร 84-5 (FRT68) (Panyatona and Nopchinwong, 2008) จึงควรมีการนำเอาพันธุ์ (สายต้น) เหล่านี้ไปทดสอบในแปลงเกษตรกร เพื่อทดสอบความสามารถในการปรับตัวของพันธุ์เหล่านี้ในสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกต่างๆ ให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้เผยแพร่แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกต่างๆ ต่อไป

7. วิธีดำเนินการ :

- อุปกรณ์

- 1) ต้นกล้ากาแฟโรบสตา จำนวน 3 พันธุ์
- 2) ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
- 3) กระถางและเลี้ยงสำหรับตัดแต่งกิ่ง
- 4) อุปกรณ์ในการซัง ตวง วัด สมุดบันทึกข้อมูล
- 5) ถุงตาข่ายสีฟ้าใส่กาแฟ ตรวจสอบใส่กาแฟ
- 6) ผ้าพลาสติกอย่างหนา คลุมกองหรือปิดกองกันน้ำฝนชั่วคราว

- วิธีการ วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 8 บล็อก ให้พันธุ์ (สายต้น) เป็นกรรมวิธี มี 3 กรรมวิธี กำหนดให้มี 6 ต้นต่อพันธุ์ต่อบล็อก กรรมวิธี มีดังนี้

1. พันธุ์ชุมพร 2 (FRT 65)
2. พันธุ์ชุมพร 84-4 (FRT 09)
3. พันธุ์ชุมพร 84-5 (FRT 68)

วิธีปฏิบัติการทดลอง

- 1) สุ่มเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ความเป็นกรด-ด่าง เนื้อดิน ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 2) ทำการเลือกกลุ่มต้นกาแฟที่มีขนาดต้นสมำเสมอ ทำการจัดบล็อก (ตามความลาดชันของพื้นที่) และสุ่มพันธุ์จัดลงในบล็อก ใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร ทำการปลูกในถุงผ้าและปลูกแบบพืชเชิงเดียว
- 3) การดูแลรักษา เพื่อให้มีการจัดการสวนที่ดี มีการให้คำแนะนำการเขตกรรมแก่เจ้าของแปลงในเรื่องการให้ปุ๋ย การใส่ปุ๋น การตัดแต่งกิ่ง การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น
- 4) การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยและปุ๋น ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน
- 5) การกำจัดวัชพืช กระทำเท่าที่จำเป็น ปีละประมาณ 2-3 ครั้ง เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน จึงจำเป็นต้องใช้วิธีดัดพ่นสารกำจัดพืชในบริเวณระหว่างแผล ส่วนใหญ่ได้โคนต้น ใช้วิกล
- 6) การให้น้ำ ไม่มีการให้น้ำ เป็นแปลงที่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว
- 7) ทำการบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลการเรียนรู้ต่อของกาแฟ ข้อมูลผลผลิตในเชิงคุณภาพ และปริมาณ
- 8) ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตากผลกาแฟให้แห้ง สีเป็นเม็ดสาร และเก็บรักษาในโรงเก็บที่มีอากาศถ่ายเทดี
- 9) ทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถิติด้วย IRRISTAT

การบันทึกข้อมูล

- 1) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน
- 2) ข้อมูลการเรียนรู้ต่อของกาแฟ ได้แก่ ความสูง ทรงพุ่ม
- 3) ให้คะแนนความอุดมสมบูรณ์ของต้น การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
- 4) ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น ผลผลิต/ไร่ น้ำหนัก 100 เม็ดสาร ข้อบกพร่องของเม็ดกาแฟ เช่น เม็ดดำ เม็ดตรา สิ่งแปลกปลอมและสิ่งเจือปน
- 5) ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และจำนวนครั้งที่เก็บเกี่ยว
- 6) คุณภาพการซิม ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ เช่น กิ่งหักง่ายเมื่อติดผลมาก การเป็นโรค ฯลฯ

- ระยะเวลาและสถานที่ : เริ่มต้น - ตุลาคม 2559 สิ้นสุด - กันยายน 2561

สถานที่ทำการทดลอง : แปลงเกษตรกรในจังหวัดชุมพร จำนวน 3 ไร่ 1 แปลง

แปลงเกษตรกรในจังหวัดระนอง จำนวน 3 ไร่ 1 แปลง

แปลงเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ไร่ 1 แปลง

แปลงในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 ไร่ 1 แปลง

8. ผลการทดลองและวิจารณ์

การทดลองนี้เป็นงานต่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงพันธุ์กาแฟโรบสตาของปีงบประมาณ 2553-2558 เนื่องจากต้องทำการเก็บข้อมูลผลผลิตอย่างน้อย 5 ปี จึงจะสรุปข้อมูลได้ จึงได้ขอขยายเวลาในการวิจัยและทำการเก็บข้อมูลต่อเนื่องจนถึงปี 2564 ทั้งนี้ แปลงกาแฟที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้เข้าร่วมในการทดลองเมื่อปี 2559 โดยใช้ต้นกาแฟโรบสตาอายุ 2 ปี (ปลูกปี 2557) จึงมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป และในปี 2560 เกษตรกรจังหวัดชุมพรและร่นองขอพื้นที่คืนเพื่อปลูกพืชอื่น ทำให้เก็บข้อมูลผลผลิตต่อเนื่องได้ถึงปี 2559/60 ซึ่งเพียงพอในการประเมินศักยภาพของพันธุ์กาแฟได้ ดังนี้

8.1) ด้านการเจริญเติบโต

- ภาคใต้กับภาคเหนือ กาแฟโรบสตาพันธุ์แนะนำทั้ง 3 พันธุ์ มีการเจริญเติบโตดีทั้งด้านความสูงและขนาดทรงพุ่ม (ตารางที่ 1 และ 2) จะเห็นว่าความสูงและทรงพุ่มมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันในอัตราส่วนความสูง : ทรงพุ่ม = 1 : 1.12 ถึง 1 : 1.30 โดยพันธุ์ชุมพร 2 มีความสูงและขนาดทรงพุ่มสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ ยกเว้นที่ร่นองที่พันธุ์ชุมพร 84-5 มีขนาดต้นใกล้เคียงกับชุมพร 2 ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยสภาพแวดล้อมตามพื้นที่และการจัดการสวนของเกษตรกร ในพื้นที่ภาคใต้ทำการปลูกที่จังหวัดชุมพรในเดือน มิ.ย. 2553 และที่จังหวัดร่นองในเดือน ส.ค. 2553 ในขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ปลูกในเดือน พ.ค. 2554 ซึ่งล่าช้าอยู่ประมาณ 1 ปี นอกจากนี้ต้นกาแฟโดยทั่วไปเกษตรกรปลูกโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโต ดังนั้นในภาพรวมต้นกาแฟในพื้นที่จังหวัดชุมพรและร่นองมีการเจริญเติบโตดีกว่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แม้จะเปรียบเทียบที่อายุเท่ากันก็ตาม (ตารางที่ 1) พบว่าสาเหตุหลักน่าจะเป็นปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝน ซึ่งในภาคเหนือมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าทางภาคใต้และมีช่วงแล้งยาวนานกว่า การเติบโตที่สะสมมาตลอดช่วงฝนเมื่อต้นระบบแล้งทำให้ต้นมีขนาดเล็กลงจากการปรับตัวให้ทนแล้งและให้อู่รอด นอกจากนี้จะเห็นว่าพื้นที่จังหวัดชุมพรเกษตรกรมีความเออใจใส่ในการดูแลต้นกาแฟเป็นอย่างดีทำให้การเจริญเติบโตดีกว่าอีก 2 แห่งมาก

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาแฟโรบสตาพันธุ์แนะนำทั้ง 3 พันธุ์ มีการเจริญเติบโตดีทั้งด้านความสูงและขนาดทรงพุ่ม (ตารางที่ 1 และ 2) โดยพันธุ์ชุมพร 2 มีความสูงและขนาดทรงพุ่มสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ

ตารางที่ 1 ความสูงของกาแฟโรบสตาพันธุ์แนะนำในแต่ละแหล่งปลูก (ปี 2554-2561)

| พันธุ์ | ความสูง (ซม.) | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
| แหล่งปลูก : ชุมพร | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ชุมพร 2 | 65.0 a | 204 a | 268 a | 300 a | 269 a | 263 a | - | - |
| ชุมพร 4 | 63.7 a | 174 b | 218 b | 247 b | 247 b | 199 b | - | - |
| ชุมพร 5 | 46.2 b | 156 b | 211 b | 232 bc | 243 b | 242 a | - | - |
| %CV | 14.0 | 8.3 | 5.7 | 6.9 | 7.5 | 10.8 | | |
| แหล่งปลูก : ระนอง | | | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 41.2 | 86.7 a | 169 a | 214 a | 245 a | 259 a | - | - |
| ชุมพร 4 | 34.9 | 58.1 c | 121 c | 167 b | 190 b | 211 c | - | - |
| ชุมพร 5 | 32.0 | 69.3 b | 154 b | 205 a | 240 a | 241 b | - | - |
| %CV | 6.5 | 6.0 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | | |
| แหล่งปลูก : อุตรดิตถ์ | | | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 85.3 a | 69.1 a | 131 | 171 a | 152 a | 218 a | 234 a | 263 a |
| ชุมพร 4 | 19.5 c | 59.1 b | 119 | 152 b | 125 b | 184 b | 199 b | 220 b |
| ชุมพร 5 | 60.6 b | 66.7 a | 117 | 152 b | 126 b | 192 a | 205 b | 230 b |
| %CV | 8.0 | 8.5 | 10.5 | 5.7 | 6.6 | 4.1 | 3.7 | 7.7 |

ตารางที่ 1 ความสูงของกาแฟโรบัสตาพันธุ์นานาในแต่ละแหล่งปลูก (ปี 2554-2561) (ต่อ)

| พันธุ์ | ความสูง (ซม.) | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
| แหล่งปลูก : ศรีสะเกษ | | | | | | | | |
| ชุมพร 2 | - | - | - | - | - | 187 a | 269 | 302 |
| ชุมพร 4 | - | - | - | - | - | 155 b | 210 | 230 |
| ชุมพร 5 | - | - | - | - | - | 162 b | 221 | 260 |
| %CV | | | | | | 12.7 | | |

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT

ตารางที่ 2 ความกว้างทรงพุ่มของกาแฟโรบัสตาพันธุ์นานาในแต่ละแหล่งปลูก (ปี 2554-2561)

| พันธุ์ | ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
| แหล่งปลูก : ชุมพร | | | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 62.2 b | 251 a | 278 a | 304 a | 328 a | 185 b | - | - |
| ชุมพร 4 | 74.6 a | 206 b | 257 b | 265 b | 278 b | 225 a | - | - |
| ชุมพร 5 | 46.4 c | 207 b | 218 c | 213 c | 272 b | 224 a | - | - |
| %CV | 14.2 | 6.8 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 11.2 | | |

แหล่งปลูก : ระนอง

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| ชุมพร 2 | 39.3 | 74.5 a | 211 a | 258 a | 276 a | 286 a | - | - |
| ชุมพร 4 | 30.0 | 36.1 c | 153 b | 214 b | 248 b | 251 b | - | - |
| ชุมพร 5 | 29.7 | 61.1 b | 217 a | 225 a | 278 a | 283 a | - | - |
| %CV | 13.2 | 8.7 | 6.5 | 6.9 | 4.8 | 9.1 | | |

แหล่งปลูก : อุตรดิตถ์

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ชุมพร 2 | 90.9 a | 184 a | 184 a | 218 a | 206 a | 282 a | 259 a | 335 a |
| ชุมพร 4 | 78.2 ab | 160 b | 160 b | 188 b | 177 b | 225 b | 212 b | 278 b |
| ชุมพร 5 | 66.5 b | 164 b | 164 b | 181 b | 170 b | 226 b | 210 b | 267 b |
| %CV | 15.8 | 24.3 | 8.9 | 7.4 | 10.3 | 14.8 | 6.8 | 7.7 |

แหล่งปลูก : ศรีสะเกษ

| | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|-------|-----|-----|
| ชุมพร 2 | - | - | - | - | - | 173 a | 278 | 307 |
| ชุมพร 4 | - | - | - | - | - | 154 b | 222 | 261 |
| ชุมพร 5 | - | - | - | - | - | 155 b | 231 | 240 |
| %CV | | | | | | 9.3 | | |

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT

8.2) ด้านการให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟ

จังหวัดชุมพรและระนองให้ผลผลิตปีแรกเมื่อเดือน ต.ค. 2556 – ม.ค. 2557 เมื่ออายุประมาณ 2 ปี ครึ่งหลังจากปลูก (มิ.ย. – ส.ค. 2553) ตัวเลขผลผลิตดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 ปลายปี 2560 เกษตรกรในจังหวัดชุมพรและระนองได้ขอพื้นที่คืนเพื่อไปปลูกปาล์มน้ำมัน จึงไม่ได้ดูแลแปลงทำให้กาแฟมีผลผลิตน้อยมาก จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติได้

จังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มให้ผลผลิตเมื่อเดือน ต.ค. 2557 – ม.ค. 2558 เมื่ออายุประมาณ 3 ปี หลังจากปลูก (พ.ค. 2554) แต่ผลผลิตในปีแรกน้อยมาก จึงไม่ได้แสดงไว้

จังหวัดศรีสะเกษเริ่มให้ผลผลิตในปี 2559 แต่ในปีต่อมาทางศูนย์วิจัยศรีสะเกษได้แจ้งว่าไม่มีข้อมูลผลผลิตเนื่องจากกาแฟออกดอกเป็นปีแรก จึงไม่มีข้อมูลผลผลิตแสดงในปี 2560 (ตารางที่ 3)

- ผลผลิตเมล็ดแห้ง

ปกติกาแฟโรบัสตาจะให้ผลผลิตสูงสุดเมื่ออายุ 5 ปี จนนั้นจะเริ่มให้ผลผลิตลดลง โดยในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 5 กาแฟทุกพันธุ์ที่จังหวัดระนองให้ผลผลิตสูงสุด 349-416 กก./ไร่ โดยพันธุ์ชุมพร 4 ให้ผลผลิตสูงที่สุด ส่วนจังหวัดชุมพร พันธุ์ชุมพร 4 และชุมพร 2 ให้ผลผลิตมากกว่า 300 กก./ไร่ ตั้งแต่ปีแรกที่ให้ผลผลิต เนื่องจากเกษตรกรใส่ปุ๋ยسمอ่ำเสมอกว่าเกษตรกรที่ร่นอง และมีการกระจายตัวของฟันสมอ (ภาคผนวก) ส่วนกาแฟที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีการใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทำให้จุดสูงสุดของผลผลิตล่าช้ากว่ากาแฟที่

ปลูกในพื้นที่ทางใต้ โดยใช้เวลา 6 ปีจึงจะให้ผลผลิตกาแฟสูงกว่า 200 กก./ไร่ โดยพันธุ์ชุมพร 2 และชุมพร 5 ให้ผลผลิต 356 และ 261 กก./ไร่ ตามลำดับ

กาแฟที่ปลูกที่จังหวัดชุมพรและร่นองเริ่มให้ผลผลิตลดลงในปี 2559 ทั้งนี้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านเขตกรรมของเกษตรกรเจ้าของแปลงมีส่วนสำคัญต่อการให้ผลผลิตของกาแฟ เนื่องจากในปี 2559 กาแฟออกดอกอน้อยชุด ร่วมกับมีปริมาณฝนน้อยและมีการทึ่งช่วง (ภาคผนวก) ซึ่งเกษตรกรที่ร่นองมีการให้น้ำในช่วงแล้ง ส่วนที่ชุมพรเกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำ ทำให้ผลผลิตของกาแฟที่ชุมพรลดลงมากกว่าที่ร่นอง

- อัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง

พันธุ์ชุมพร 5 และชุมพร 4 มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งดี ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 20% ขึ้นไป ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 2 มีค่านี้ต่ำเป็นบางปี (ตารางที่ 4)

- น้ำหนัก 100 เมล็ดแห้ง (ที่ความชื้นประมาณ 12.5%)

พันธุ์ชุมพร 5 มีน้ำหนัก 100 เมล็ดแห้งดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 2 และชุมพร 84-4 มีค่านี้ดีพอใช้เฉลี่ยระหว่าง 14.4-18.4 กรัม (ตารางที่ 5)

- อัตราเมล็ดเต็มผล

พันธุ์ชุมพร 5 มีอัตราเมล็ดเต็มผลสูงสุด ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พันธุ์นี้มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูงที่สุด ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 2 มีเมล็ดลีบหรือเมล็ดเดียวมากกว่าพันธุ์อื่น ๆ จึงเป็นผลให้พันธุ์นี้มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งต่ำที่สุดด้วยเช่นกัน (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 3 ผลผลิตเมล็ดแห้งของกาแฟ robusta พันธุ์นานาในแต่ละแหล่งปลูก (ปี 2556-2560)

| พันธุ์ | ผลผลิตเมล็ดแห้ง (กก./ไร่) | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 2556/57 | 2557/58 | 2558/59 | 2559/60 | 2560/61 | เฉลี่ย |
| แหล่งปลูก : ชุมพร | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 305 a | 241 b | 417 a | 147 | - | 278 |
| ชุมพร 4 | 339 a | 292 a | 178 c | 104 | - | 228 |
| ชุมพร 5 | 124 b | 188 c | 233 b | 141 | - | 172 |
| %CV | 14.0 | 17.9 | 16.6 | 26.2 | | |

แหล่งปลูก : ร่นอง

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--------|---|-----|
| ชุมพร 2 | 137 a | 248 b | 404 | 251 ab | - | 260 |
| ชุมพร 4 | 65 b | 147 c | 416 | 211 b | - | 210 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| ชุมพร 5 | 109 a | 337 a | 349 | 284 a | - | 270 |
| %CV | 29.3 | 27.7 | 18.4 | 19.9 | | |
| แหล่งปลูก : อุตรดิตถ์ | | | | | | |
| ชุมพร 2 | - | - | 35.4 c | 143 a | 356 a | 178 |
| ชุมพร 4 | - | - | 53.9 b | 45 c | 218 b | 106 |
| ชุมพร 5 | - | - | 88.6 a | 81 b | 261 b | 144 |
| %CV | | | 23.2 | 20.1 | 21.9 | |
| แหล่งปลูก : ศรีสะเกษ | | | | | | |
| ชุมพร 2 | - | - | - | 20.3 | N/A | 20.3 |
| ชุมพร 4 | - | - | - | 16.4 | N/A | 16.4 |
| ชุมพร 5 | - | - | - | 9.4 | N/A | 9.4 |
| %CV | | | | 97.2 | | |

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT

N/A = ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 4 อัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งของกาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะนำในแต่ละแหล่งปลูก
(ปี 2556-2560)

| พื้นที่ | อัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง (%) | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 2556/57 | 2557/58 | 2558/59 | 2559/60 | 2560/61 | เฉลี่ย |
| แหล่งปลูก : ชุมพร | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 18.4 c | 16.5 c | 21.7 b | 21.3 b | - | 19.5 |
| ชุมพร 4 | 22.6 a | 19.9 b | 22.8 a | 25.3 a | - | 22.7 |
| ชุมพร 5 | 20.8 b | 26.5 a | 23.3 a | 25.3 a | - | 24.0 |
| %CV | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | | |
| แหล่งปลูก : ระนอง | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 22.9 c | 17.5 b | 25.1 b | 19.9 b | - | 21.4 |
| ชุมพร 4 | 25.3 a | 18.4 b | 27.0 a | 25.8 a | - | 24.1 |
| ชุมพร 5 | 24.2 b | 27.0 a | 23.7 c | 26.0 a | - | 25.2 |
| %CV | 2.6 | 8.7 | 4.0 | 7.9 | | |
| แหล่งปลูก : อุตรดิตถ์ | | | | | | |
| ชุมพร 2 | - | - | 21.0 | 22.5 c | 22.5 | 22.0 |
| ชุมพร 4 | - | - | 22.7 | 25.3 a | 22.1 | 23.4 |
| ชุมพร 5 | - | - | 22.2 | 23.2 b | 23.0 | 22.8 |
| %CV | | | 9.5 | 1.3 | 6.4 | |
| แหล่งปลูก : ศรีสะเกษ | | | | | | |
| ชุมพร 2 | - | - | - | 17.7 | N/A | 17.7 |
| ชุมพร 4 | - | - | - | 16.4 | N/A | 16.4 |
| ชุมพร 5 | - | - | - | 9.4 | N/A | 9.4 |
| %CV | | | | - | | |

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT

ค่าเฉลี่ยที่ไม่มี CV (Coefficient of variance) เนื่องจากจำนวนข้อมูลเพียงพอ

ND = ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 5 น้ำหนัก 100 เมล็ดแห้งของกาแฟรับสต้าพันธุ์แนะนำในแต่ละแหล่งปลูก (ปี 2556-2560)

| พันธุ์ | น้ำหนัก 100 เมล็ดแห้ง (กรัม) | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 2556/57 | 2557/58 | 2558/59 | 2559/60 | 2560/61 | เฉลี่ย |
| แหล่งปลูก : ชุมพร | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 15.7 b | 17.1 b | 16.8 a | 15.1 b | - | 16.2 |
| ชุมพร 4 | 17.0 ab | 15.7 c | 13.6 b | 16.3 ab | - | 15.7 |
| ชุมพร 5 | 17.4 a | 19.4 a | 17.2 a | 17.6 a | - | 17.9 |
| %CV | 6.7 | 6.1 | 4.4 | 8.4 | | |
| แหล่งปลูก : ระโนง | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 19.3 b | 18.2 b | 16.7 a | 19.4 a | - | 18.4 |
| ชุมพร 4 | 17.5 c | 16.8 c | 14.9 b | 18.8 a | - | 17.0 |
| ชุมพร 5 | 21.0 a | 19.6 a | 16.4 a | 17.2 a | - | 18.6 |
| %CV | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 17.1 | | |
| แหล่งปลูก : อุตรดิตถ์ | | | | | | |
| ชุมพร 2 | - | - | 14.3 b | 18.5 a | 17.6 a | 16.8 |
| ชุมพร 4 | - | - | 13.6 b | 14.3 b | 15.2 b | 14.4 |
| ชุมพร 5 | - | - | 16.7 a | 19.5 a | 18.3 a | 18.2 |
| %CV | | | 7.0 | 3.4 | 4.1 | |
| แหล่งปลูก : ศรีสะเกษ | | | | | | |
| ชุมพร 2 | - | - | - | 12.2 | N/A | 12.2 |
| ชุมพร 4 | - | - | - | 13.5 | N/A | 13.5 |
| ชุมพร 5 | - | - | - | 14.4 | N/A | 14.4 |
| %CV | | | | - | | |

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT

ค่าเฉลี่ยที่ไม่มี CV (Coefficient of variance) เนื่องจากจำนวนข้ามไม่เพียงพอ

ND = ไม่มีข้อมูล

ตารางที่ 6 อัตราเม็ดเต็มผลของกาแฟรับสตาพันธุ์แนะนำในแต่ละแหล่งปลูก (ปี 2556-2560)

| พันธุ์ | อัตราเม็ดเต็มผล | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 2556/57 | 2557/58 | 2558/59 | 2559/60 | 2560/61 | เฉลี่ย |
| แหล่งปลูก : ชุมพร | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 1.52 | 1.63 b | 1.71 b | 1.58 b | - | 1.61 |
| ชุมพร 4 | 1.74 | 1.79 a | 1.85 a | 1.69 a | - | 1.77 |
| ชุมพร 5 | 1.73 | 1.87 a | 1.82 a | 1.75 a | - | 1.79 |
| %CV | 8.3 | 5.4 | 3.8 | 4.8 | | |
| แหล่งปลูก : ระนอง | | | | | | |
| ชุมพร 2 | 1.41 | 1.59 c | 1.59 b | 1.16 c | - | 1.44 |
| ชุมพร 4 | 1.48 | 1.73 b | 1.85 a | 1.53 b | - | 1.65 |
| ชุมพร 5 | 1.45 | 1.86 a | 1.79 a | 1.76 a | - | 1.72 |
| %CV | 7.9 | 3.8 | 5.8 | 14.4 | | |
| แหล่งปลูก : อุตรดิตถ์ | | | | | | |
| ชุมพร 2 | - | - | 1.44 b | 1.57 c | 1.65 b | 1.55 |
| ชุมพร 4 | - | - | 1.72 a | 1.82 a | 1.81 a | 1.78 |
| ชุมพร 5 | - | - | 1.69 a | 1.68 b | 1.72 a | 1.70 |
| %CV | | | 6.4 | 2.9 | 5.9 | |
| แหล่งปลูก : ศรีสะเกษ | | | | | | |
| ชุมพร 2 | - | - | - | 0.58 | N/A | 0.58 |
| ชุมพร 4 | - | - | - | 0.57 | N/A | 0.57 |

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|------|-----|------|
| ชุมพร 5 | - | - | - | 0.41 | N/A | 0.41 |
| %CV | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT
ค่าเฉลี่ยที่ไม่มี CV (Coefficient of variance) เนื่องจากจำนวนข้ามไม่เพียงพอ
ND = ไม่มีข้อมูล

จะเห็นได้ว่าทั้งปัจจัยด้านพันธุกรรมและปัจจัยสภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ แม้ว่ากาแฟทั้ง 3 พันธุ์มีการเจริญเติบโตดีแต่สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญมากสามารถจำกัดการเจริญเติบโตของกาแฟได้ ปริมาณน้ำฝนและการกระจายตัวของน้ำฝนสำคัญมาก (สุรีรัตน์ และเสawanี, 2548; Cannell, 1985) โดยเฉพาะแหล่งปลูกส่วนใหญ่ที่ยังคงอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เช่นเดียวกับแปลงทดลองของเกษตรกรทั้งสามแห่งในการทดลองนี้

กาแฟเป็นพืชที่ผลผลิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเติบโตทางลำต้น (vegetative growth) เนื่องจากดอกและผลเกิดบนกิ่งที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี (Wintgens, 2004) โดยกิ่งกาแฟจะให้ผลผลิตได้ประมาณ 3 ปี แล้วจะทิ้งกิ่ง ต้นกาแฟที่สร้างกิ่งใหม่อยู่ส่วนนำเสนองึงจะให้ผลผลิตที่ดีได้ กาแฟโรบัสตาที่ปลูกในแหล่งที่มีช่วงการกระจายตัวของน้ำฝนแคบ เช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเหนือ มีการเจริญเติบโตรวมต่ำกว่าภาคใต้และน่าจะมีผลต่อการสร้างผลผลิตด้วยเช่นกัน

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาในสภาพการปลูกเป็นพืชเดียว พันธุ์ทั้งสามมีการเจริญเติบโตดีในแหล่งปลูกภาคใต้ต่ำกว่าภาคเหนือเนื่องจากปริมาณและการกระจายตัวของน้ำฝนต่ำกว่า ผลผลิตทั้งสามพันธุ์เมื่อกาแฟมีอายุ 5 ปี ซึ่งเป็นปีที่ให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟแห้งสูงที่สุด ที่จังหวัดชุมพร พันธุ์ชุมพร 2 ให้ผลผลิตสูงที่สุด 417 กก./ไร่ จังหวัดระนอง พันธุ์ชุมพร 4 ให้ผลผลิตสูงที่สุด 416 กก./ไร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พันธุ์ชุมพร 2 ให้ผลผลิตสูงสุดเมื่ออายุ 6 ปี ให้ผลผลิต 356 กก./ไร่ เมื่อนำผลผลิตมาเฉลี่ยรวมแล้ว ทุกพันธุ์ให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน

คุณภาพของเมล็ดกาแฟ พันธุ์ชุมพร 2 และชุมพร 4 มีน้ำหนัก 100 เมล็ดแห้งและขนาดเมล็ดปานกลาง น้ำหนัก 100 เมล็ด ตั้งแต่ 13.6-19.4 กรัม ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ชุมพร 5 มีขนาดใหญ่กว่าและน้ำหนักเมล็ดต่ำกว่าโดยมีน้ำหนัก 100 เมล็ด อยู่ที่ 16.4-21.0 กรัม นอกจากนี้พันธุ์ชุมพร 2 มีเมล็ดลีบหรือเมล็ดเดี่ยวมากกว่าอีกสองพันธุ์โดยพิจารณาจากอัตราเมล็ดเต็มผล

นอกจากนี้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านเขตกรรมของเกษตรกรเจ้าของแปลงมีส่วนสำคัญต่อการให้ผลผลิตของกาแฟ

10. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

- ได้ข้อมูลประเมินความสามารถของแต่ละพันธุ์เพื่อประกอบการพิจารณาการนำพันธุ์ไปปลูกในแหล่งปลูกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพันธุ้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน

11. คำขอบคุณ

คณะกรรมการวิจัยขอขอบคุณ นางพวยอม สมศรี นายเสมอ คงประสิทธิ์ และนายสมพงษ์ เพชรส่า เกษตรกร เจ้าของแปลงกาแฟทดลองในจังหวัดชุมพร ธนาวงศ์ และอุตตരดิตถ์ ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเป็นอย่างดี

12. เอกสารอ้างอิง

ผานิษ งานรณรงค์การ ยุพิน กสินเกษมพงษ์ และ คงวงศ์ คลอดเพ็ง. 2550. ทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาสายพันธุ์ ต่างประเทศ 13สายพันธุ์. ใน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2548-2550, ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร. หน้า 85-105.

สรีรัตน์ หวานทวี และ เสาวนีย์ มีมุทา. 2548. การศึกษาพัฒนาการของผลและความแก่จัดทางสรีรวิทยาของเมล็ดกาแฟโรบัสตา. ใน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2545-2547, ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร. หน้า 113-131.

สรีรัตน์ ปัญญาโถนจะ และ ยุพิน กสินเกษมพงษ์. 2550. การคัดเลือกพันธุ์กาแฟโรบัสตาต่างประเทศ 12สายพันธุ์. ใน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2548-2550, ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร. หน้า 157-168.

Cannel, M.G.R. 1985. Physiology of the coffee crop. pp. 108-134. In: M.N. Clifford and K.C. Willson (eds.). Coffee: Botany, Biochemistry and Production of Beans and Beverage. Croom Helm, London.

Lambot, C. and P. Bouharmont. 2004. Pruning. pp. 284-307. In: J.N. Wintgens (ed.) Coffee: Growing, Processing, Sustainable Production. WILEY-VCH, Verlag GmbH &Co. KGaA. Weinheim.




Marsh, A., J.M. Frank, J. Op De Lakk, P. Naka, P. Ngangoranatigarn, S. Thuantavee, Y. Kasinkasaempong, W. Twishsri, J. Boonyarut, S. Kositcharoenkul, A. Wongurai, P. Lhekkong, T. Kraitorng, P. Nopchinwong, O. Sungthada, N. Laempet, S. Taruyanon, P. Chantanumat, V. Onmukh, P. Chauytem, S. Yusathid, T. Winston and K. Chapman. 2006. Special R&D Report on the FAO-Thailand Robusta Coffee Project (TCP/THA/3002 (A)): Improvement of Coffee

Quality and Prevention of Ochratoxin A on Robusta Coffee. Department of Agriculture and FAO, Bangkok. 79 pp.

Panyatona, S. and P. Nopchinwong. 2008. Selection Characteristics for Predicting Yield Potential of Robusta Coffee. p. 141-146. *In*: N. Chomchalow,, V. Chantrasmi and N. Sukhvibul (Eds.), Proceedings of the International Workshop on Tropical and Subtropical Fruits. Chiang Mai, Thailand. Acta Hort. 787, ISSH 2008.

13. ภาคผนวก

ปริมาณและการกระจายตัวของฝน (พ.ค.-ต.ค. 2556-2560)



29.



30.

31.

ที่มา : ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศสวี

ภาคผนวก (ต่อ)

ปริมาณและการกระจายตัวของฝน (พ.ค.-ต.ค. 2556-2560)



ที่มา : ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศสวี